



MRAC 1626 n°11-2710

Vass7R05s031-035



INRA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp2121

0Mtp 2121
MRAC 1626
Vass 7R05s 31-35

0

0Mtp2121

MRAC 1626 n°11-2710

Vass7R05s031-035

0
Vass 7R05s 31-35

Vass7R05s036-040







Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013
CodeVar : 0 3802
CodeIntro : 0Mtp2121
Nom Var : MRAC 1626 n°11-2710
Observateur :
Emplacement : Vass7R05s036-040

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE					
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne	élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	2 (f)		26/3	0	
2	2 (f)		28/3	0	
3	Tf	\	\	\	\
4	3	26/3	28/3	3 (de filet)	
5	Tf	\	\	\	\
Moyenne	3		27/3 +3	3	10

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	02/05 -3		26/07	31/07 +1	06/09	

SUIVI DE MATURITE				
Dates	30.08	02.09	06.09	
IR	21	23	23	
Valeur papier PH				

Remarque :

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013
CodeVar : 03802 CodeIntro : 0Mtp2121
Nom Var : MRAC 1626 n°11-2710
Observateur :
Emplacement : Vass7R05s031-035

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	2 (F)		28/3	1	
2	3	19/03	28/3	1	
3	3	26/3	28/3	1	
4	2 (F)		26/3	0	
5	2 (F)		26/3	2 (petites)	
Moyenne	6		27/3	3	5

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	03/06 - 2		19/08	30/08	06.09	

SD - 612117 : MV non prise en compte
1 mois d'écart avec 7R5236-40. vu CM.

Dates	30.08	02.09	06.09	
IR	15,5	17	21,5	
Valeur papier PH			bois de papier	

Remarque :

Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2015

CodeVar : 3802 CodeIntro : 0Mtp2121

Nom Var : MRAC 1626

Observateur :

Emplacement : Vass7R05s031-035

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	5	21/3	7/4	4	
2	6	21/3	3/4	9	
3	7	21/3	7/4	8	
4	5	21/3	3/4	5	
5	6	21/3	3/4	6	
Moyenne	29		5/04 +8	32	11

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
21/5	26/5 +2		13/07	20/07 +1	14/08 0	

SUIVI DE MATURITE				
Dates	10-08	12/08		
IR	20	19,8		
Valeur papier PH				

Remarque : 10.08 posé 1 filet se.

Année : 2015

Code cépage :

Code introduction : OM1p2121

Observateur : LACOMBE

Nom introduction :

MRAC 1626 n°11-2710

Emplacement : Vass 7R5, 31-35 (+36-40)

GRAPPE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 202	Longueur sans pédoncule Valeur absolue (en cm) : 16	très courte (<10 cm)	courte (10-14 cm)	moyenne (14-18 cm)	longue (18-25 cm)	très longue (>25 cm)
Oiv 203	Largeur Valeur absolue (en cm) : 9	très étroite (<5 cm)	étroite (5-10 cm)	moyenne (10-15 cm)	large (15-20 cm)	très large (>20 cm)
Oiv 204	Compacité	très lâche	lâche	moyenne	compacte	très compacte
000-46	Millerandage	nul ou t. fb.	faible	moyen	fort	très fort
Oiv 206	Longueur du pédoncule Valeur absolue (en cm) : 2	très court (<3 cm)	court (3-5 cm)	moyen (5-7 cm)	long (7-10 cm)	très long (>10 cm)
Oiv 207	Lignification du pédoncule	à la base seulement		jusqu'à la moitié	plus de la moitié	
000-11	Couleur de l'axe de la rafle	1-coloré	2-non coloré			
Oiv 208	Forme de la grappe	1-cylindrique	2-conique	3-en entonnoir		
Oiv 209	Nombre d'ailes de la grappe principale	1-absentes	2- Une à deux ailes	3- trois à quatre ailes	4- cinq à six ailes	5- plus de six ailes

BAIE											
Oiv 220	Longueur Valeur absolue (en mm) : 17				très courte ($<8\text{mm}$)	courte (8-14mm)	moyenne (14-20mm)	longue (20-26mm)	très longue ($>26\text{mm}$)		
Oiv 221	Largeur Valeur absolue (en mm) : 15				très étroite ($<8\text{mm}$)	étroite (8-14mm)	moyenne (14-20mm)	large (20-26mm)	très large ($>26\text{mm}$)		
Oiv 222	Uniformité de la grosseur				1-non uniforme	3-uniforme					
Oiv 223	Forme	1- sphérique aplatie	2- sphérique	3- elliptique courte	4- elliptique longue	5- cylindrique	6- tronconique	7- ovoïde	8- obovoïde	9- arquée	10- fusiforme
Oiv 225	Couleur épiderme			1- vert jaune	2- rose	3- rouge	4- gris	5-rouge foncé violet	6- bleu noir		
Oiv 226	Uniformité couleur épiderme				1- non uniforme	3- uniforme					
Oiv 227	Pruine				nul ou t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte		
Oiv 228	Épaisseur pellicule				très mince	mince	moyenne	épaisse	très épaisse		
Oiv 229	Ombilic (apparence)				1- peu apparent	2- apparent					
000-18	Région ombilicale (dépression)				1- déprimée	2- non déprimée					
Oiv 230	Coloration de la pulpe				1-non colorée	2- colorée					
Oiv 231	Intensité de la pigmentation anthocianique de la pulpe				nul ou t. fb.	faible	moyenne	forte	très forte		
Oiv 232	Succulence de la pulpe				1- peu juteuse	2- moyennement juteuse	3- très juteuse				
Oiv 233	Rendement en jus (ml / 100g baies)					faible	moyen	élevé			
Oiv 235	Fermeté de la pulpe				1- molle	2- légèrement ferme	3- très ferme				
Oiv 236	Saveur				1-aucune	2- muscatée	3- foixée	4- herbacée	5-autre		
Oiv 238	Longueur pédicelle 8				très court ($<4\text{mm}$)	court (4-8mm)	moyen (8-12mm)	long (12-16mm)	très long ($>16\text{mm}$)		
Oiv 240	Séparation du pédicelle				1- très facile	2- facile	3- difficile				

PEPINS					
Oiv 241	Formation des pépins	1- absente (type corinthien)	2- rudimentaire (type sultanien)	3- complète	
Oiv 242	Longueur pépins Valeur absolue (en mm) : 7	très courts	courts	moyens	très longs
Oiv 243	Poids des pépins (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en mg) :	très faible (<10mg)	faible (25mg)	moyen (40mg)	très élevé (>65mg)
Oiv 244	Cannelures transversales face dorsale pépins	1-absentes	2-présentes		